

Zinc 750

flow met overwegend Zn

Samenstelling

- ▶ 35% zink (Zn) totaal, of 600 g/l

Kenmerken

- ▶ pH van het product: 8 – 9
- ▶ pH bij verdunning van 0.5%: 8.50 +/- 0.50
- ▶ Te bewaren bij een temperatuur: >5°C
- ▶ Dichtheid: 1.70

Verpakking

- ▶ Bus van 1 l, doos van 12 x 1 l
- ▶ Bus van 5 l, doos van 4 x 5 l
- ▶ Bus van 10 l

Gebruik

- ▶ Bladbespuiting

EG MESTSTOF. Meststof op basis van zink (zinkhydroxide). Zinc 750 is speciaal aanbevolen voor teelten met een hoge zinkbehoefte. Een vroege toepassing bevordert de efficiëntie van het product.

Gebruiksdosis

- ▶ Maïs: 1 x 4 l/ha als bodemtoepassing: 1,5 l/ha via het blad, in het 6 blad-stadium.
- ▶ Groenten: 1, 5 l/ha wanneer de plant 5 cm heeft bereikt, eventueel herhalen na 15 dagen indien noodzakelijk.
- ▶ Citrus en andere fruitsoorten: 100 cc/100 l water, 2 tot 3 maal herhalen, of 500 cc/100 l water bij de bladval
- ▶ Graangewassen: 1,5 l/ha, in het stadium uitstoeling.
- ▶ Weiden: 5 l/ha, toe te passen tijdens de groei, een wachttijd van 10 dagen respecteren alvorens te laten beweiden. Herhalen indien nodig.
- ▶ Rijst: onderdompelen in een 1% oplossing voor het uitplanten
- ▶ Wijnbouw: 1 l/ha na de oogst of in het begin van de groei, toepassen op een droog gewas.
- ▶ Enkel te gebruiken in geval van erkende behoefte, de benodigde hoeveelheden niet overschrijden

